


Geef wormen geen kans. Ontworm vier keer per jaar.

Lintwormen

Lintwormen komen zowel bij honden als bij katten voor. Zij worden altijd via tussengastheren overgedragen bijvoorbeeld na opname van knaagdieren, besmet vlees en veelvuldig via vlooiën (en luizen). Na besmetting kunnen zij ontsteking van de darm en diarree veroorzaken, hoofdzakelijk bij jonge of ondervoede dieren. Ook kan braken worden gezien, soms met zichtbare wormsegmenten. Een besmetting herkent u aan langwerpige segmenten in de ontlasting en de omgeving ('rijstekorrels'). Tevens kunnen dieren door irritatie van de anus met hun achterste over de grond gaan schuren. Mensen kunnen worden besmet door het per ongeluk inslikken van een tussengastheer (vlo), wat vooral bij kinderen wordt gezien. Irritatie van de anus is dan het belangrijkste symptoom. Van groter belang is dat de mens voor sommige lintwormen als tussengastheer kan optreden, met name van de vossenlintworm (*Echinococcus*). Onvolgroeide stadia hiervan kunnen bij mensen een soms fatale aandoening van de lever en longen veroorzaken.

Toedienen een probleem?

Het toedienen van tabletten kan lastig zijn. Tegenwoordig zijn er echter kleinere en gecoatete tabletten, die uw hond of kat veel gemakkelijker doorslikt. Door de coating vallen deze tabletten niet uit elkaar en krijgt uw huisdier altijd de juiste dosering. Zo wordt ontwormen een kleinigheid en weet u zeker dat uw hond of kat goed is beschermd. Vraag uw dierenarts om meer informatie.



Vier keer per jaar ontwormen

Niet altijd ziet u bij een wormbesmetting iets afwijkends aan uw huisdier. Toch is het van groot belang om aan de gevolgen van infecties voor uw hond of kat én voor uw omgeving te denken. Zoals eerder vermeld vinden besmettingen met spoelwormeitjes uit de omgeving bij kinderen meestal gemakkelijk plaats. Voorkom daarom uitscheiding van eitjes in de omgeving door regelmatig uw huisdier te ontwormen. Als u uw hond of kat regelmatig ontwormt, bij voorkeur vier keer per jaar, dan draagt u bij aan een goede bescherming van uw huisdier en uw gezin. Puppy's en kittens dienen het eerste half jaar frequenter te worden ontwormd.

Ontwormingsschema's

Puppy's: ontworm uw puppy's in levensweek 2, 4, 6, 8, 10 en 12; daarna maandelijks totdat ze een half jaar oud zijn.

Kittens: ontworm uw kittens in levensweek 6, 8, 10 en 12; daarna maandelijks totdat ze een half jaar oud zijn.

Volwassen katten & honden: ontworm uw dier(en) tenminste 4x per jaar

Heeft uw huisdier de volgende symptomen, raadpleeg dan uw dierenarts:

- Diarree (met bloed)
- Braken
- Verstopping
- Bloedarmoede
- Achterblijvende groei
- Doffe vacht



Voor meer informatie:

Novartis Consumer Health B.V., Business Unit Animal Health
Postbus 3025, 4800 DA Breda (NL)
www.ah.novartis.nl / www.ah.novartis.be

© Novartis Animal Health Inc, 2005 © registered trademark of Novartis AG, Basel, Switzerland.

Vier keer
per jaar

Ontwormen? Een kleinigheid!



**Bescherm uw huisdier
en uw gezin**

Bescherm uw huisdier en uw gezin.

Een hond of kat in huis is een groot plezier voor het hele gezin, ook voor kinderen. Vanzelfsprekend wilt u uw huisdier gezond laten opgroeien en het zo goed mogelijk tegen ziekte beschermen. Toch komt het regelmatig voor dat honden en katten besmet worden met wormen. Dit kan gebeuren door bijvoorbeeld contact met een besmette omgeving, via besmette uitwerpselen maar ook via insecten (vlo en mug).

Sommige wormen die huisdieren oplopen kunnen ook mensen besmetten, en veroorzaken dan een zogenaamde zoönose. Kinderen kunnen gemakkelijk worden besmet bij het spelen in de zandbak of in het park waar honden of katten hun behoeften doen. Maar ook bij tuinieren of contact elders met besmette grond kunt u zelf besmet raken.

Als u zwanger bent of als u jonge kinderen heeft, is het raadzaam meer informatie in te winnen bij uw dierenarts over de risico's van zoönoses.



Waarom is ontwormen zo belangrijk?


Spoelwormen

De spoelworm is de meest voorkomende worm bij honden en katten. Besmetting van volwassen huisdieren vindt plaats door opname van eitjes uit de omgeving of door opname van besmette tussengastheren (knaagdieren). Puppy's worden bijna altijd geboren met een besmetting en puppy's en kittens worden bovendien vaak besmet via de moedermelk. Verschijnselen die kunnen optreden zijn: een opgeblazen buik, braken, diarree, een doffe vacht, hoesten of koliek. Deze worden vooral bij jonge dieren gezien. Het is dus belangrijk om overdracht van besmetting via het moederdier te voorkomen of te beperken.

Ook kinderen kunnen worden besmet door opname van eitjes in speelzand of besmette grond. De larven van spoelwormen verspreiden zich na opname door het hele lichaam. Bereiken ze de ogen, dan kunnen ze tot verstoringen van het gezichtsvermogen en in zeldzame gevallen zelfs tot blindheid leiden. Het is dus van groot belang de uitscheiding van eitjes in de omgeving door honden en katten te voorkomen. Ontworming is hiervoor essentieel.

Haakwormen

Haakwormen (Ancylostoma) komen vooral in subtropische gebieden (waaronder Zuid-Europa) voor, maar worden ook in België (kat) aangetroffen. Larven dringen via de huid of slijmvliezen het dier binnen. Besmetting van puppy's en kittens geschiedt ook via de moedermelk. In de dunne darm veroorzaken zij kleine bloedende wondjes, die in ernstige gevallen kunnen leiden tot heftige diarree en bloedarmoede bij uw huisdier.



Ook mensen kunnen worden besmet via huidcontact met larven op het strand of op vochtige grond, waarbij sterk jeukende ontstekingen het gevolg kunnen zijn.

Zweepwormen

Besmetting met deze worm vindt plaats door opname van eitjes uit de omgeving. Zweepwormen kunnen bij de hond ontsteking van de wand van de dikke darm veroorzaken met buikpijn, diarree, verminderde eetlust, lusteloosheid en bloederige ontlasting tot gevolg. Het ziektebeeld is vaak langdurig en diagnose kan moeilijk zijn.



Hartwormen

De hartworm komt met name voor in warme gebieden, waaronder Zuid-Europa. Deze parasiet wordt overgebracht door muggen, die bij het bijten van de hond (of kat) besmettelijke larven in de huid inbrengen. Wanneer u uw hond meeneemt op vakantie naar risicogebieden, dan is het raadzaam om preventieve maatregelen te nemen.

